

CONSIGLI TECNICI CEREALICOLA VIERIS 27 APRILE 2020

FRUMENTO

Fase fenologica; Fine levata (SEMINE TARDIVE) – Botticella (SEMINE CONVENZIONALI)

Consigli per coltivazione frumento in filiera

TRATTAMENTI: Nel precedente bollettino avevamo dato dei consigli di trattamento preventivo, con i seguenti prodotti;

- 1) Mancozeb
- 2) Procloraz e/o in miscela (generici)
- 3) Tebuconazolo (Folicur, Persyng, ecc.)

In questa fase, in corrispondenza alla emissione della spiga, si consiglia, anche in previsione delle imminenti piogge che potrebbero dare origine alle famigerate ruggini, intervenire con prodotti con miscela di triazoli, per dare una maggiore copertura e garanzia di efficacia.

Periodo emissione spiga, inizio fioritura

Consigliamo a questo punto le seguenti opzioni di linee a difesa:

- 1) **Prosaro** (Protioconazolo + Tebuconazolo)
- 2) **Elatus era** (Benzovindiflupyr + Protioconazolo)
- 3) **Osiris** (Metconazolo + Epossiconazolo)

Insetticidi: al momento non si presentano casi di lema e pochi afidi, nel caso intervenire con un insetticida a base di piretroidi tipo cipermetrina o deltametrina

Diserbo

In questo periodo si sconsiglia l'uso di diserbi per non incorrere a fitotossicità

CONCIMAZIONE

- 1) Botticella; si consiglia utilizzo di concime a base di urea 46% nella misura di 60/80 kg ha, attenzione che vi sia disponibilità di umidità nel terreno
- 2) Spigatura; si consiglia di utilizzare 1.5/2 q.li ha di nitrato ammonico 26%, da preferire quelli con alto contenuto di zolfo.

Si sconsiglia l'utilizzo di:

- 1) Concimi fogliari a base di azoto in quantità importanti
- 2) Bagnanti